

Escuela de las Leyes Biológicas®



MÓDULO 4 - BLOQUE 13 - CLASE 51

El material de esta clase se puede consultar online actualizado y con videos integrados en esta dirección:
<https://www.leyesbiologicas.com/clase5101-ectodermo-constelaciones-cerebrales-corteza.htm>

El Programa de la Escuela de las Leyes Biológicas, en su 4.ª Etapa 2023-2025, consta de 96 clases en 6 módulos durante 24 bloques mensuales de 4 clases, con 775 temas de estudio.

Ha sido cuidadosamente estructurado, ampliado y perfeccionado desde el 2010 al 2025 (15 años) basado en los descubrimientos y los aportes científicos del Dr. Ryke Geerd Hamer e incorporando la experiencia y los aportes de Mark Pfister y de la Escuela de las Leyes Biológicas.

Este PDF es **GRATUITO** para su estudio de forma digital o impreso en colores con alta calidad.

Es **MUY IMPORTANTE COMPARTIRLO LIBREMENTE** con la mayor cantidad de personas que sea posible.

El contenido de este PDF es solamente informativo y **NO** sustituye el consejo médico profesional.

Es decisión y responsabilidad de cada persona tener o no en cuenta este conocimiento **PARA EL BENEFICIO PROPIO** o si decide recomendarlo.

Leyesbiologicas.com

Materiales de Estudio de las Leyes Biológicas

Clase 51

Constelaciones Cerebrales Corteza No Territorial - Ectodermo

Este material fue elaborado por la *Escuela de las Leyes Biológicas* con base en el trabajo del *Dr. Hamer* e información de *Mark Pfister*.

Condiciones para tener estas constelaciones

Habrà una constelación de la Corteza No Territorial cuando la persona tenga por lo menos 2 SBS con sus relés cerebrales en ambos hemisferios en cualquiera de las siguientes combinaciones:

- 1- Ambos SBS en la Fase Activa.
- 2- Un SBS en la Fase Activa y otro en la Epicrisis.
- 3- Ambos SBS en la Epicrisis.

Constelación Frontal

Percepción femenina (relé en el hemisferio izquierdo):

Vestigios del recubrimiento interno de los exconductos de la tiroides hacia el canal gastrointestinal.

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): miedo al frente con impotencia. Ver una situación peligrosa y no poder intervenir, no poder hacer nada: "es urgente hacer algo, pero tengo las manos atadas, no puedo hacer nada", "¡que alguien haga algo!", "habría que hacer algo urgentemente, ¡pero nadie hace nada!"

Percepción masculina (relé en el hemisferio derecho):

Vestigios del recubrimiento interno de los arcos branquiales o faríngeos.

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): miedo frontal ante un peligro que se aproxima inevitablemente. "¡Me está cayendo encima una montaña!"

CONSTELACIONES DE LA CORTEZA CEREBRAL

LADO FEMENINO



Vestigios del recubrimiento interno de los exconductos de la tiroides hacia el canal gastrointestinal
Miedo al frente con impotencia
"Es urgente hacer algo, pero tengo las manos atadas"
¡Que alguien haga algo!

Vestigios del recubrimiento interno de los arcos branquiales o faríngeos
Miedo frontal
Un peligro que se aproxima inevitablemente
"¡Me está cayendo encima una montaña!"

LADO MASCULINO



MIEDO AL FRENTE
CORTEZA PREMOTORA
LÓBULO FRONTAL

Esmalte de los dientes hemiparte derecha de la boca
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

Esmalte de los dientes hemiparte izquierda de la boca
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

Células Alfa de Langerhans principalmente en el páncreas (glucagón)
Miedo al frente con rechazo a persona, animal o situación, generalmente con asco o repulsión
Comúnmente ante situaciones feas sexuales
Sentido femenino de oposición (**hipoglucemia**)

Células Beta de Langerhans principalmente en el páncreas (insulina)
Miedo al frente con oposición o resistencia a alguien o a una situación (**hiperglucemia, "diabetes"**)

Motricidad de la musculatura estriada de la laringe
Miedo frontal ante un peligro inesperado con la imposibilidad de huir y la necesidad de pasar desapercibido: "quisiera desaparecer (escaparme)"

Motricidad de la musculatura estriada de los bronquios
Miedo frontal ante un peligro inminente que amenaza con entrar al territorio y la necesidad de impedirlo: "¡están por entrar!"

MUJER DIESTRA

Recubrimiento interno de la laringe
Susto inesperado "suspendida en el aire"
Recubrimiento de las cuerdas vocales
Susto inesperado "me quedé sin palabras"



HOMBRE ZURDO

Recubrimiento interno de venas coronarias, vagina, ectocérvix y vesículas seminales
Frustración sexual-afectiva
No ser penetrada o no sentirse atendida por el hombre
TAQUICARDIA



TERRITORIO FEMENINO

ESTRÓGENOS



MANÍA

ESTADO YANG EXTROVERTIDO ACTIVO IMPERATIVO PRECISO CONTROLADOR

Recubrimiento interno rectal
Pérdida de identidad
No saber cuál es el rol o lugar en la jerarquía del grupo o lugar donde se vive

Rec. interno de pelvis renal y uréter derecho
No poder recubrir, decorar el interior del territorio
R. I. vejiga hemip. derecha
No poder reconocer los límites del territorio
R. I. uretra hemip. derecha
No poder reconocer un lugar como territorio propio

HOMBRE DIESTRO

Recubrimiento interno de los bronquios
Amenaza en el territorio "están por quitármelo"



MUJER ZURDA

Recubrimiento interno arterias coronarias y carótidas, arco aórtico
Pérdida del territorio
Estar sometido en un territorio propio por alguien más fuerte
BRADICARDIA



TERRITORIO MASCULINO

TESTOSTERONA



DEPRESIÓN

ESTADO YIN INTROVERTIDO PASIVO MEDITATIVO LLOROSO SENTIMENTAL

Leyesbiologicas.com

Leyesbiologicas.com

Retinas (hemipartes izquierdas de ambos ojos)
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

Retinas (hemipartes derechas de ambos ojos)
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

Cuerpos vítreos (hemipartes izquierdas)
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

Cuerpos vítreos (hemipartes derechas)
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

MIEDO EN LA NUCA
CORTEZA VISUAL
LÓBULO OCCIPITAL



Leyesbiologicas.com

Leyesbiologicas.com

Comportamientos

- Miedo al frente, miedo constante sobre el futuro, a lo que viene o está adelante, por suceder. Se piensa que va a ocurrir lo peor.
- Ansiedad, angustia.
- Ojos exaltados, desorbitados (para ver mejor lo que se avecina).
- En caso de presentarse un miedo frontal demasiado intenso, puede ocurrir un desmayo como forma de protección extrema.

Epicrisis: ataque de pánico.

Sentido biológico (utilidad) de la constelación: ante la presencia de situaciones de miedo al frente, que amenazan la vida, es necesario estar en alerta permanente de forma preventiva, anticipatoria, ya que un movimiento hacia adelante podría ser mortal.



Constelación del Centro de Control de la Glucosa en la Sangre

Percepción femenina (relé en el hemisferio izquierdo):

Células Alfa de Langerhans principalmente en el páncreas.

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): miedo al frente con rechazo, asco o repulsión a persona o animal. Comúnmente ante situaciones desagradables de tipo sexual.

Percepción masculina (relé en el hemisferio derecho):

Células Beta de Langerhans principalmente en el páncreas.

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): miedo al frente con oposición o resistencia a alguien o a una situación, el individuo no se decide a atacar o a huir; se mantiene inmóvil pero firme, en resistencia u oposición.

CONSTELACIONES DE LA CORTEZA CEREBRAL

LADO FEMENINO



Vestigios del recubrimiento interno de los exconductos de la tiroides hacia el canal gastrointestinal
Miedo al frente con impotencia
"Es urgente hacer algo, pero tengo las manos atadas"
¡Que alguien haga algo!

Vestigios del recubrimiento interno de los arcos branquiales o faríngeos
Miedo frontal
Un peligro que se aproxima inevitablemente
"¡Me está cayendo encima una montaña!"

LADO MASCULINO



**MIEDO AL FRENTE
CORTEZA PREMOTORA
LÓBULO FRONTAL**

Esmalte de los dientes hemiparte derecha de la boca
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

Esmalte de los dientes hemiparte izquierda de la boca
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

Células Alfa de Langerhans principalmente en el páncreas (glucagón)
Miedo al frente con rechazo a persona, animal o situación, generalmente con asco o repulsión
Comúnmente ante situaciones feas sexuales
Sentido femenino de oposición (**hipoglucemia**)

Células Beta de Langerhans principalmente en el páncreas (insulina)
Miedo al frente con oposición o resistencia a alguien o a una situación (**hiperglucemia, "diabetes"**)

Motricidad de la musculatura estriada de la laringe
Miedo frontal ante un peligro inesperado con la imposibilidad de huir y la necesidad de pasar desapercibido: "quisiera desaparecer (escaparme)"

Motricidad de la musculatura estriada de los bronquios
Miedo frontal ante un peligro inminente que amenaza con entrar al territorio y la necesidad de impedirlo: "¡están por entrar!"

MUJER DIESTRA



Recubrimiento interno de la laringe
Susto inesperado
"suspendida en el aire"
Recubrimiento de las cuerdas vocales
Susto inesperado
"me quedé sin palabras"

Recubrimiento interno de los bronquios
Amenaza en el territorio
"están por quitármelo"

HOMBRE DIESTRO




HOMBRE ZURDO



Recubrimiento interno de venas coronarias, vagina, ectocervix y vesículas seminales
Frustración sexual-afectiva
No ser penetrada o no sentirse atendida por el hombre
TAQUICARDIA

Recubrimiento interno arterias coronarias y carótidas, arco aórtico
Pérdida del territorio
Estar sometido en un territorio propio por alguien más fuerte
BRADICARDIA

MUJER ZURDA



TERRITORIO FEMENINO

ESTRÓGENOS



MANÍA

ESTADO YANG EXTROVERTIDO ACTIVO IMPERATIVO PRECISO CONTROLADOR

Recubrimiento interno rectal
Pérdida de identidad
No saber cuál es el rol o lugar en la jerarquía del grupo o lugar donde se vive

R. I. cardias, curvat. menor de estómago, píloro, duodeno (1.º)
Injusticia, rencor en el territorio
R. I. conducto biliar y vesícula biliar
Territorio tangible quitado injustamente
R. I. ducto pancreático
Territorio intangible quitado injustamente

TERRITORIO MASCULINO

TESTOSTERONA



DEPRESIÓN

ESTADO YIN INTROVERTIDO PASIVO MEDITATIVO LLOROSO SENTIMENTAL

Rec. interno de pelvis renal y uréter derecho
No poder recubrir, decorar el interior del territorio
R. I. vejiga hemip. derecha
No poder reconocer los límites del territorio
R. I. uretra hemip. derecha
No poder reconocer un lugar como territorio propio

Pelvis renal y uréter izq.
No poder recubrir, decorar el exterior del territorio
R. I. vejiga hemiparte izq.
No poder marcar el territorio
R. I. uretra hemiparte izq.
No tener un lugar propio donde marcar el territorio

Leyesbiologicas.com

Leyesbiologicas.com

Retinas (hemipartes izquierdas de ambos ojos)
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

Retinas (hemipartes derechas de ambos ojos)
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

Cuerpos vitreos (hemipartes izquierdas)
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

Cuerpos vitreos (hemipartes derechas)
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

**MIEDO EN LA NUCA
CORTEZA VISUAL
LÓBULO OCCIPITAL**



Leyesbiologicas.com

Leyesbiologicas.com

Comportamientos

Fase Activa:

- Siempre alerta y en oposición, se opone a todo, actúa con mucha precaución.
- Estado ansioso.
- En caso de presentarse un miedo frontal demasiado intenso, puede ocurrir un desmayo como forma de protección extrema.
- Dependiendo de cuál conflicto sea más intenso o cuál se atenúe, se manifestará hiperglucemia o hipoglucemia o se alternará entre ambas.

Epicrisis:

- Ataque de pánico.
- Sentir que "se camina sobre algodón", que no se pisa sobre un terreno firme (posiblemente Células Alfa).
- Visión lejana, percepción de ver con un telescopio invertido como mecanismo para alejar el peligro (posiblemente Células Beta).

Sentido biológico (utilidad) de la constelación:



Constelación Motora

Reglas de la Lateralidad Biológica:

Motricidad de la musculatura estriada de los lados derecho (relé izquierdo) e izquierdo (relé derecho) del cuerpo.

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): movimiento impedido, interrumpido o bloqueado.

Ejemplos:

Todo el cuerpo: sentirse atrapado, aprisionado, no poder escapar.

Piernas: movimiento impedido de desplazarse hacia un sitio o para conseguir una meta, de ir con alguien o acompañar a alguien.

Brazos: movimiento impedido de retener/abrazar o de expulsar/alejar a alguien.

Manos: movimiento impedido de retener, agarrar, rechazar o realizar una tarea manual.

Cara: sentirse impedido de mostrar su verdadera imagen o cara. Perder la dignidad, el respeto, el honor, el prestigio; "perder la cara"; ser objeto de burla; quedar en ridículo; ser puesto en evidencia o en vergüenza; "me vieron la cara", "se me cae la cara de vergüenza".

Lengua y labios: movimiento impedido de poder hablar, decir lo que se quiere o se necesita.

Cuello (C5-C7 y T1-T2): sentirse impedido de quitarse el yugo; no poder levantar la cabeza; no poder dejar de obedecer o de someterse.

CONSTELACIONES DE LA CORTEZA CEREBRAL

LADO FEMENINO



Vestigios del recubrimiento interno de los exconductos de la tiroides hacia el canal gastrointestinal

Miedo al frente con impotencia
"Es urgente hacer algo, pero tengo las manos atadas"
¡Que alguien haga algo!

Vestigios del recubrimiento interno de los arcos branquiales o faríngeos

Miedo frontal
Un peligro que se aproxima inevitablemente
"¡Me está cayendo encima una montaña!"

LADO MASCULINO



Esmalte de los dientes hemiparte derecha de la boca
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

Esmalte de los dientes hemiparte izquierda de la boca
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

MIEDO AL FRENTE
CORTEZA PREMOTORA
LÓBULO FRONTAL

Células Alfa de Langerhans principalmente en el páncreas (glucagón)
Miedo al frente con rechazo a persona, animal o situación, generalmente con asco o repulsión
Comúnmente ante situaciones feas sexuales
Sentido femenino de oposición (**hipoglucemia**)

Células Beta de Langerhans principalmente en el páncreas (insulina)
Miedo al frente con oposición o resistencia a alguien o a una situación (**hiperglucemia, "diabetes"**)

Motricidad de la musculatura estriada de la laringe
Miedo frontal ante un peligro inesperado con la imposibilidad de huir y la necesidad de pasar desapercibido: "quisiera desaparecer (escaparme)"

Motricidad de la musculatura estriada de los bronquios
Miedo frontal ante un peligro inminente que amenaza con entrar al territorio y la necesidad de impedirlo: "¡están por entrar!"

MUJER DIESTRA



Recubrimiento interno de la laringe
Susto inesperado
"suspendida en el aire"
Recubrimiento de las cuerdas vocales
Susto inesperado
"me quedé sin palabras"

HOMBRE DIESTRO



Recubrimiento interno de los bronquios
Amenaza en el territorio
"están por quitármelo"

HOMBRE ZURDO



Recubrimiento interno de venas coronarias, vagina, ectocérvix y vesículas seminales
Frustración sexual-afectiva
No ser penetrada o no sentirse atendida por el hombre
TAQUICARDIA

MUJER ZURDA



Recubrimiento interno arterias coronarias y carótidas, arco aórtico
Pérdida del territorio
Estar sometido en un territorio propio por alguien más fuerte
BRADICARDIA

TERRITORIO FEMENINO

ESTRÓGENOS



MANÍA

ESTADO YANG
EXTROVERTIDO
ACTIVO
IMPERATIVO
PRECISO
CONTROLADOR

TERRITORIO MASCULINO

TESTOSTERONA



DEPRESIÓN

ESTADO YIN
INTROVERTIDO
PASIVO
MEDITATIVO
LLOROSO
SENTIMENTAL

Recubrimiento interno rectal
Pérdida de identidad
No saber cuál es el rol o lugar en la jerarquía del grupo o lugar donde se vive

Rec. interno de pelvis renal y uréter derecho
No poder recubrir, decorar el interior del territorio
R. I. vejiga hemip. derecha
No poder reconocer los límites del territorio
R. I. uretra hemip. derecha
No poder reconocer un lugar como territorio propio

R. I. cardias, curvat. menor de estómago, píloro, duodeno (1.º)
Injusticia, rencor en el territorio
R. I. conducto biliar y vesícula biliar
Territorio tangible quitado injustamente
R. I. ducto pancreático
Territorio intangible quitado injustamente

Pelvis renal y uréter izq.
No poder recubrir, decorar el exterior del territorio
R. I. vejiga hemiparte izq.
No poder marcar el territorio
R. I. uretra hemiparte izq.
No tener un lugar propio donde marcar el territorio

Mejilla
Ruptura del contacto

Epidermis
Ruptura del contacto

Periostio
Ruptura del contacto dolorosa, intensa

Pierna y pie derechos

Pierna y pie izquierdos

Leyesbiologicas.com

Retinas (hemipartes izquierdas de ambos ojos)
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

MIEDO EN LA NUCA
CORTEZA VISUAL
LÓBULO OCCIPITAL

Retinas (hemipartes derechas de ambos ojos)
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

Cuerpos vitreos (hemipartes izquierdas)
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

Cuerpos vitreos (hemipartes derechas)
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

Leyesbiologicas.com

Leyesbiologicas.com

Comportamientos

La Constelación Motora puede presentar, de forma general, 2 tipos de comportamiento: **hipermovilidad** (exceso de movilidad) o **hipomovilidad** (disminución evidente y progresiva o inmovilidad total), la diferencia está dada por cómo se produce la constelación.

- **Hipermovilidad** (2 movimientos impedidos con intervalo de tiempo entre uno y otro, con miembros del grupo percibidos a diferente nivel):
- Repetición constante de movimientos musculares, tics, temblores.
- Incremento pronunciado del tono muscular en forma de temblor en reposo y dificultad para realizar movimientos voluntarios ("Parkinson").
- Hiperactividad motora, no puede quedarse quieto.
- Alucinaciones de movimientos.


Cuando la persona duerme no se manifiestan los temblores, tics o el "Parkinson".

Si primeramente hubo un movimiento impedido por otro miembro del grupo, percibido como un igual o por encima o debajo de la persona (**Reglas de la Lateralidad Biológica**), se reduce el movimiento solo en un lado del cuerpo; posteriormente hay otro movimiento impedido por otro miembro de la manada percibido de manera diferente que el primero, donde quedan implicados ambos lados cerebrales y corporales; produciéndose la Constelación Motora. La persona presentará hiperactividad permanente mientras esté en constelación, como mecanismo para superar el doble movimiento impedido y sobrevivir con una nueva capacidad propia de movimiento en el grupo.

- **Hipomovilidad** (Focos de Hamer simultáneos en ambos hemisferios por bloqueo total del individuo ante una situación peligrosa):
- Disminución de la movilidad en ambos lados del cuerpo.

Si la constelación ocurre por la llegada simultánea de Focos de Hamer en los 2 hemisferios de la Corteza Motora, es porque ha ocurrido un movimiento impedido o bloqueado general del individuo. Lo más probable es que en un ambiente natural, haya surgido un gran peligro para la vida del que no se puede escapar y la salida más eficaz y segura sea "hacerse pasar por muerto", quedar totalmente inmóvil para aparentar estar muerto y que el depredador instintivamente deseché la presa por el peligro de alimentarse de un cadáver que puede estar en descomposición.

Sentido biológico (utilidad) de la constelación: en dependencia de cómo se haya llegado a la constelación, el individuo presentará una parálisis motora general para aparentar estar muerto, "hacerse pasar por muerto", ante la imposibilidad de moverse, no poder huir, avanzar, sentirse atrapado hasta que el peligro haya pasado o desarrollará una hipermovilidad para poder superar el doble movimiento impedido y sobrevivir con una nueva capacidad propia de movimiento en el grupo.



Constelación Sensorial

Reglas de la Lateralidad Biológica:

Epidermis de los 2 lados del cuerpo: derecho (relé izquierdo) e izquierdo (relé derecho).

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): ruptura del contacto (separación).

- Querer tener o retomar el contacto (por estar separado). Querer tocar o ser tocado, acariciar o ser acariciado.
- Querer romper el contacto (separarse). No querer tocar o ser tocado, no querer acariciar o ser acariciado.

CONSTELACIONES DE LA CORTEZA CEREBRAL

LADO FEMENINO



Vestigios del recubrimiento interno de los exconductos de la tiroides hacia el canal gastrointestinal
Miedo al frente con impotencia
"Es urgente hacer algo, pero tengo las manos atadas"
¡Que alguien haga algo!

Vestigios del recubrimiento interno de los arcos branquiales o faríngeos
Miedo frontal
Un peligro que se aproxima inevitablemente
"¡Me está cayendo encima una montaña!"

LADO MASCULINO



**MIEDO AL FRENTE
CORTEZA PREMOTORA
LÓBULO FRONTAL**

Esmalte de los dientes hemiparte derecha de la boca
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

Esmalte de los dientes hemiparte izquierda de la boca
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

Células Alfa de Langerhans principalmente en el páncreas (glucagón)
Miedo al frente con rechazo a persona, animal o situación, generalmente con asco o repulsión
Comúnmente ante situaciones feas sexuales
Sentido femenino de oposición (**hipoglucemia**)

Células Beta de Langerhans principalmente en el páncreas (insulina)
Miedo al frente con oposición o resistencia a alguien o a una situación (**hiperglucemia, "diabetes"**)

Motricidad de la musculatura estriada de la laringe
Miedo frontal ante un peligro inesperado con la imposibilidad de huir y la necesidad de pasar desapercibido: "quisiera desaparecer (escaparme)"

Motricidad de la musculatura estriada de los bronquios
Miedo frontal ante un peligro inminente que amenaza con entrar al territorio y la necesidad de impedirlo: "¡están por entrar!"

MUJER DIESTRA



Recubrimiento interno de la laringe
Susto inesperado
"suspendida en el aire"
Recubrimiento de las cuerdas vocales
Susto inesperado
"me quedé sin palabras"

HOMBRE DIESTRO



Recubrimiento interno de los bronquios
Amenaza en el territorio
"están por quitármelo"

HOMBRE ZURDO



Recubrimiento interno de venas coronarias, vagina, ectocérvix y vesículas seminales
Frustración sexual-afectiva
No ser penetrada o no sentirse atendida por el hombre
TAQUICARDIA

MUJER ZURDA



Recubrimiento interno arterias coronarias y carótidas, arco aórtico
Pérdida del territorio
Estar sometido en un territorio propio por alguien más fuerte
BRADICARDIA

TERRITORIO FEMENINO

ESTRÓGENOS

TERRITORIO MASCULINO

TESTOSTERONA



MANÍA

ESTADO YANG EXTROVERTIDO ACTIVO IMPERATIVO PRECISO CONTROLADOR



DEPRESIÓN

ESTADO YIN INTROVERTIDO PASIVO MEDITATIVO LLOROSO SENTIMENTAL

Recubrimiento interno rectal
Pérdida de identidad
No saber cuál es el rol o lugar en la jerarquía del grupo o lugar donde se vive

R. I. cardias, curvat. menor de estómago, píloro, duodeno (1.º)
Injusticia, rencor en el territorio
R. I. conducto biliar y vesícula biliar
Territorio tangible quitado injustamente
R. I. ducto pancreático
Territorio intangible quitado injustamente

Rec. interno de pelvis renal y uréter derecho
No poder recubrir, decorar el interior del territorio
R. I. vejiga hemip. derecha
No poder reconocer los límites del territorio
R. I. uretra hemip. derecha
No poder reconocer un lugar como territorio propio

Pelvis renal y uréter izq.
No poder recubrir, decorar el exterior del territorio
R. I. vejiga hemiparte izq.
No poder marcar el territorio
R. I. uretra hemiparte izq.
No tener un lugar propio donde marcar el territorio

Leyesbiologicas.com

Leyesbiologicas.com

Retinas (hemipartes izquierdas de ambos ojos)
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

Retinas (hemipartes derechas de ambos ojos)
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

Cuerpos vítreos (hemipartes izquierdas)
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

Cuerpos vítreos (hemipartes derechas)
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

**MIEDO EN LA NUCA
CORTEZA VISUAL
LÓBULO OCCIPITAL**



Leyesbiologicas.com

Leyesbiologicas.com

Comportamientos

- Alucinaciones sensoriales, percepción extrasensorial. Se percibe la presencia de personas lejanas o fallecidas, de forma energética o al tacto.
- Se perciben sabores de alimentos, olores como perfumes o el olor de personas que no están presentes (Corteza Gustativa y Olfativa).
- Pérdida de la memoria reciente, a corto plazo, mala memoria.
- Diagnósticos de "déficit de atención".

Sentido biológico (utilidad) de la constelación: ante rupturas de contacto con varios miembros importantes del grupo, se adquiere la capacidad sensorial para percibir más allá de los sentidos normales y sobrevivir encontrando a los miembros faltantes. Si lo que se desea es romper el contacto con miembros del grupo, todo parece indicar que se eliminan de la memoria los recuerdos recientes (pendiente de comprobación).



Constelación Sensorial Auditiva

Reglas de la Lateralidad Biológica:

Cóclea o caracol en el oído interno derecho (relé izquierdo) e izquierdo (relé derecho).

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): rechazo a lo que se escucha (sonido o voz); querer romper el contacto con un sonido o información auditiva, no querer escuchar algo: "me molesta lo que oigo", "lo que escucho es imposible o increíble", "¡no quiero escuchar esto!"

Comportamientos

- Alucinaciones auditivas con 3 posibles opciones:

- 1) Tinnitus (acúfenos) en ambos oídos.
- 2) Voces en ambos oídos.
- 3) Tinnitus en un oído, voces en el otro oído.

Los tinnitus pueden ser de 2 tipos:

- Ruidos, pitidos, zumbidos, campaneos, siseos, rechinidos, etc.
- Repetición de palabra, frase o melodía.

La voz o las voces que se escuchan (como discurso):

- Pueden ser de las personas que estaban presentes en el momento del DHS o de otras personas con la misma frecuencia o tono de voz.
- Lo que "dicen" puede apuntar en dirección al conflicto auditivo.

Cuanto más intenso es el shock biológico, más real (psicótica) se torna la alucinación auditiva para la persona.




Constelación Postsensorial

Reglas de la Lateralidad Biológica:

Periostio del lado derecho (**relé izquierdo**) e izquierdo (**relé derecho**) del cuerpo.

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): ruptura del contacto (separación) dolorosa, intensa; por querer tener o romper el contacto.

CONSTELACIONES DE LA CORTEZA CEREBRAL



Comportamientos

- Alucinaciones sensoriales.
- Ausencias.
- Pérdida de la memoria a largo plazo o pérdida completa de la memoria (amnesia), demencia, Alzheimer.
- En ambos lados del cuerpo se sienten dolores agudos internos que corren a lo largo de los huesos y pueden sentirse como descargas o corrientes eléctricas, combinado con frialdad interna que puede llegar a percibirse como tener heladas algunas partes del cuerpo (reumatismo).

Sentido biológico (utilidad) de la constelación: ante rupturas del contacto dolorosas, intensas, profundas, con varios miembros importantes del grupo, se adquiere la capacidad sensorial de percibir más allá de los sentidos normales para sobrevivir encontrando a los miembros faltantes. La pérdida de la memoria a largo plazo ayuda a superar rupturas del contacto con individuos con los que hay lazos muy importantes y duraderos que involucran recuerdos de muchos años o de toda la vida.



Separación Brutal: Causa de Alzheimer



Constelación Visual (Occipital)

Esta constelación se forma cuando están implicados los relés que controlan las hemipartes izquierdas y derechas de las retinas o los relés que controlan los cuerpos vítreos de ambos ojos, no combinándose ambos órganos.

Reglas de la Lateralidad Biológica:

- **Retinas hemipartes izquierdas (relé izquierdo) y derechas (relé derecho) de ambos ojos.**

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico) de las retinas: miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) sobre la persona o de prevención (sobrepotección) de un miembro del grupo (conocido, identificado) de quien no puede librarse, que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando. Miedo a ser juzgado y como consecuencia abandonado por los seres queridos.

- **Cuerpos vítreos izquierdo y derecho (relés en ambos hemisferios cerebrales).**

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico) de los cuerpos vítreos: miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) en relación a un perseguidor impersonal, no definido, un depredador que aparece de forma imprevista; ya sea persona o animal (bestia, fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, bandido, asesino, represor). Miedo al control fiscal (hacienda) o al gobierno que vigila.

CONSTELACIONES DE LA CORTEZA CEREBRAL

LADO FEMENINO



Vestigios del recubrimiento interno de los exconductos de la tiroides hacia el canal gastrointestinal
Miedo al frente con impotencia
"Es urgente hacer algo, pero tengo las manos atadas"
¡Que alguien haga algo!

Vestigios del recubrimiento interno de los arcos branquiales o faríngeos
Miedo frontal
Un peligro que se aproxima inevitablemente
"¡Me está cayendo encima una montaña!"

LADO MASCULINO



MIEDO AL FRENTE
CORTEZA PREMOTORA
LÓBULO FRONTAL

Esmalte de los dientes hemiparte derecha de la boca
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

Esmalte de los dientes hemiparte izquierda de la boca
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

Células Alfa de Langerhans principalmente en el páncreas (glucagón)
Miedo al frente con rechazo a persona, animal o situación, generalmente con asco o repulsión
Comúnmente ante situaciones feas sexuales
Sentido femenino de oposición (**hipoglucemia**)

Células Beta de Langerhans principalmente en el páncreas (insulina)
Miedo al frente con oposición o resistencia a alguien o a una situación (**hiperglucemia, "diabetes"**)

Motricidad de la musculatura estriada de la laringe
Miedo frontal ante un peligro inesperado con la imposibilidad de huir y la necesidad de pasar desapercibido: "quisiera desaparecer (escaparme)"

Motricidad de la musculatura estriada de los bronquios
Miedo frontal ante un peligro inminente que amenaza con entrar al territorio y la necesidad de impedirlo: "¡están por entrar!"

MUJER DIESTRA

Recubrimiento interno de la laringe

Susto inesperado
"suspendida en el aire"
Recubrimiento de las cuerdas vocales
Susto inesperado
"me quedé sin palabras"



HOMBRE DIESTRO

Recubrimiento interno de los bronquios
Amenaza en el territorio
"están por quitármelo"



HOMBRE ZURDO

Recubrimiento interno de venas coronarias, vagina, ectocérvix y vesículas seminales
Frustración sexual-afectiva
No ser penetrada o no sentirse atendida por el hombre
TAQUICARDIA



Recubrimiento interno arterias coronarias y carótidas, arco aórtico
Pérdida del territorio
Estar sometido en un territorio propio por alguien más fuerte
BRADICARDIA

MUJER ZURDA

TERRITORIO FEMENINO
ESTRÓGENOS

Recubrimiento interno rectal
Pérdida de identidad
No saber cuál es el rol o lugar en la jerarquía del grupo o lugar donde se vive

R. I. cardias, curvat. menor de estómago, píloro, duodeno (1.º)
Injusticia, rencor en el territorio



MANÍA
ESTADO YANG
EXTROVERTIDO
ACTIVO
IMPERATIVO
PRECISO
CONTROLADOR

Rec. interno de pelvis renal y uréter derecho
No poder recubrir, decorar el interior del territorio
R. I. vejiga hemip. derecha
No poder reconocer los límites del territorio
R. I. uretra hemip. derecha
No poder reconocer un lugar como territorio propio

R. I. conducto biliar y vesícula biliar
Territorio tangible quitado injustamente

TERRITORIO MASCULINO
TESTOSTERONA

ESTADO YIN
INTROVERTIDO
PASIVO
MEDITATIVO
LLOROSO
SENTIMENTAL

Leyesbiologicas.com

Leyesbiologicas.com

Retinas (hemipartes izquierdas de ambos ojos)
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

Retinas (hemipartes derechas de ambos ojos)
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

MIEDO EN LA NUCA
CORTEZA VISUAL
LÓBULO OCCIPITAL

Cuerpos vitreos (hemipartes izquierdas)
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

Cuerpos vitreos (hemipartes derechas)
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

Leyesbiologicas.com

Leyesbiologicas.com

Comportamientos

- Delirio (fobia, manía, paranoia) de persecución (retinas o cuerpos vítreos). Aunque la persona vea que no es perseguida o los hechos se lo demuestran, no puede parar el delirio de persecución.
- Alucinaciones visuales (retinas). Ve gente que le persigue o vigila en todos lados. Ve a la Virgen, a Dios, a los ángeles, el aura de las personas.

Cuando hay consternación por la Constelación del Tronco Cerebral, esta constelación no tiene freno.

Sentido biológico (utilidad) de la constelación: ante varios peligros que acechan por detrás, el individuo no puede descuidarse ni un momento para sobrevivir al ataque de depredadores escondidos que pueden aparecer en cualquier momento. Las alucinaciones visuales (retinas) lo mantienen en estado de alerta constante, aumentando las probabilidades de sobrevivir.



Constelación Fronto-Occipital

Percepción femenina (relé en el hemisferio izquierdo):

Vestigios del recubrimiento interno de los exconductos de la tiroides hacia el canal gastrointestinal.

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): miedo al frente con impotencia. Ver una situación peligrosa y no poder intervenir, no poder hacer nada: "es urgente hacer algo, pero tengo las manos atadas, no puedo hacer nada", "¡que alguien haga algo!", "habría que hacer algo urgentemente, ¡pero nadie hace nada!"

Percepción masculina (relé en el hemisferio derecho):

Vestigios del recubrimiento interno de los arcos branquiales o faríngeos.

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): miedo frontal ante un peligro que se aproxima inevitablemente. "¡Me está cayendo encima una montaña!"

Reglas de la Lateralidad Biológica:

- Retinas hemipartes izquierdas (relé izquierdo) y derechas (relé derecho) de ambos ojos.

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico) de las retinas: miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) sobre la persona o de prevención (sobrepotección) de un miembro del grupo (conocido, identificado) de quien no puede librarse, que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando. Miedo a ser juzgado y como consecuencia abandonado por los seres queridos.

- Cuerpos vítreos izquierdo y derecho (relés en ambos hemisferios cerebrales).

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico) de los cuerpos vítreos: miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) en relación a un perseguidor impersonal, no definido, un depredador que aparece de forma imprevista; ya sea persona o animal (bestia, fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, bandido, asesino, represor). Miedo al control fiscal (hacienda) o al gobierno que vigila.

CONSTELACIONES DE LA CORTEZA CEREBRAL

LADO FEMENINO



LADO MASCULINO



Vestigios del recubrimiento interno de los exconductos de la tiroides hacia el canal gastrointestinal
Miedo al frente con impotencia
"Es urgente hacer algo, pero tengo las manos atadas"
¡Que alguien haga algo!

Vestigios del recubrimiento interno de los arcos branquiales o faringeos
Miedo frontal
Un peligro que se aproxima inevitablemente
"¡Me está cayendo encima una montaña!"

MIEDO AL FRENTE
CORTEZA PREMOTORA
LÓBULO FRONTAL

Esmalte de los dientes hemiparte derecha de la boca
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

Esmalte de los dientes hemiparte izquierda de la boca
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

Células Alfa de Langerhans principalmente en el páncreas (glucagón)
Miedo al frente con rechazo a persona, animal o situación, generalmente con asco o repulsión
Comúnmente ante situaciones feas sexuales
Sentido femenino de oposición (**hipoglucemia**)

Células Beta de Langerhans principalmente en el páncreas (insulina)
Miedo al frente con oposición o resistencia a alguien o a una situación (**hiperglucemia, "diabetes"**)

Motricidad de la musculatura estriada de la laringe
Miedo frontal ante un peligro inesperado con la imposibilidad de huir y la necesidad de pasar desapercibido: "quisiera desaparecer (escaparme)"

Motricidad de la musculatura estriada de los bronquios
Miedo frontal ante un peligro inminente que amenaza con entrar al territorio y la necesidad de impedirlo: "¡están por entrar!"

MUJER DIESTRA



Recubrimiento interno de la laringe
Susto inesperado
"suspendida en el aire"
Recubrimiento de las cuerdas vocales
Susto inesperado
"me quedé sin palabras"

HOMBRE DIESTRO



Recubrimiento interno de los bronquios
Amenaza en el territorio
"están por quitármelo"

HOMBRE ZURDO



Recubrimiento interno de venas coronarias, vagina, ectocérvix y vesículas seminales
Frustración sexual-afectiva
No ser penetrada o no sentirse atendida por el hombre
TAQUICARDIA

MUJER ZURDA



Recubrimiento interno arterias coronarias y carótidas, arco aórtico
Pérdida del territorio
Estar sometido en un territorio propio por alguien más fuerte
BRADICARDIA

TERRITORIO FEMENINO

ESTRÓGENOS



MANÍA

ESTADO YANG EXTROVERTIDO ACTIVO IMPERATIVO PRECISO CONTROLADOR

TERRITORIO MASCULINO

TESTOSTERONA



DEPRESIÓN

ESTADO YIN INTROVERTIDO PASIVO MEDITATIVO LLOROSO SENTIMENTAL

Leyesbiologicas.com

Leyesbiologicas.com

Retinas (hemipartes izquierdas de ambos ojos)
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

Retinas (hemipartes derechas de ambos ojos)
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

MIEDO EN LA NUCA
CORTEZA VISUAL
LÓBULO OCCIPITAL

Cuerpos vítreos (hemipartes izquierdas)
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

Cuerpos vítreos (hemipartes derechas)
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental


Leyesbiologicas.com

Leyesbiologicas.com

Comportamientos

- Miedo y ansiedad constante por lo que pueda ocurrir en el futuro y delirio de persecución (fobia, manía, paranoia).
- Alucinaciones visuales (retinas). Ve gente que le persigue o vigila en todos lados. Ve a la Virgen, a Dios, a los ángeles, el aura de las personas.

Sentido biológico (utilidad) de la constelación: es la combinación de las constelaciones Frontal y Visual (Occipital), por lo que el individuo necesita estar en máxima alerta y atento a las posibles amenazas de depredadores que puedan aparecer súbitamente.



Este material fue elaborado por la **Escuela de las Leyes Biológicas** con base en el trabajo del **Dr. Hamer** e información de **Mark Pfister**.

Planes de estudio de la Escuela de las Leyes Biológicas

Aspectos	Programa de Estudio ABIERTO y GRATUITO	Clases Virtuales en Vivo (Zoom)	Clases Presenciales Guadalajara (GDL)	Clases Presenciales Otras Ciudades México
Material de estudio	Online en constante actualización PDF imprimible que se actualiza con cada grupo	Online en constante actualización PDF imprimible Actualizado	Online en constante actualización PDF imprimible Actualizado	Online en constante actualización PDF imprimible Actualizado
Clases en vivo	NO	4 x mes, 1 semanal	4 x mes, 1 semanal	4 x mes continuas Jueves a Domingo
Horarios de clases en vivo	NO	Matutino 9:00 am Vespertino 3:00 pm	Matutino 9:00 am Vespertino 4:00 pm	Jueves/Viernes: 6:00 pm Sábado/Domingo: 9:00 am
Fecha de inicio	Enero (1) Mayo (5) Septiembre (9)	Enero (1) Mayo (5) Septiembre (9)	Enero (1) Mayo (5) Septiembre (9)	A criterio del organizador
Tiempo de estudio	17 meses	24 meses	24 meses	24 meses
Carga horaria presencial	NO	288 horas 96 clases de 3 horas	288 horas 96 clases de 3 horas	288 horas 96 clases de 3 horas
68 test de comprobación de conocimientos	NO	SI Oral	SI Impreso	SI Impreso
Cantidad de clases regulares	68	96	96	96
675 síntomas en forma de simulación de consulta (oral) "Cofre de los Achaques"	NO	SI	SI	SI
Aplicación de Exámenes parciales 7 Módulos (opcional)	NO	Oral Online en Zoom Escrito en Guadalajara	Oral Online en Zoom Escrito en Guadalajara	Oral Online en Zoom Escrito en otra ciudad
Aplicación del Examen Final	NO	Presencial en Guadalajara	Presencial en Guadalajara	Presencial en Guadalajara
Aclaración de dudas en vivo	NO	SI	SI	SI
Aclaración de dudas por e-mail	NO	SI	SI	SI
Consultas personales gratuitas	NO	Ilimitadas Presencial o en Zoom	Ilimitadas Presencial o en Zoom	Ilimitadas Presencial o en Zoom
Constancia de participación	NO	NO	NO	NO
Diploma Graduado y Certificado	NO	Solo si se aprueban todos los exámenes	Solo si se aprueban todos los exámenes	Solo si se aprueban todos los exámenes
Participación en el Grupo de Estudio	NO	SI Presencial en GDL y Online	SI Presencial en GDL y Online	SI Presencial Ciudad y Online
Participación en Todas las Actividades de la Escuela	NO	Encuentros, Convenciones, Graduaciones, Posadas	Encuentros, Convenciones, Graduaciones, Posadas	Encuentros, Convenciones, Graduaciones, Posadas
Grabaciones de audio y video	NO	NO	NO	NO